



NORMAS GENERALES PREPARACIÓN PARA LA COLONOSCOPIA CON SEDACIÓN

ALIMENTACIÓN

- 48h antes de tomar MOVIPREP®, no tome ni legumbres, frutas ni verduras.
- No tomar alimentos sólidos durante las 15 horas previas. Sí líquidos.
- 3h antes de la exploración **NO TOMARÁ NADA DE ALIMENTOS NI LÍQUIDOS.**
- Si es Ud. estreñido, tome 3 días antes de la prueba, 2 sobres de MOVICOL®, cada día.

MEDICACIÓN

- Comunicará a su médico si es alérgico a medicamentos.
- El día de la prueba podrá recibir medicación sedante, por lo que no podrá conducir vehículos, y **se recomienda que venga acompañado.**
- Puede seguir tomando los medicamentos que tenga prescritos; pero si son anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios o antiinflamatorios deberá suspenderlos en los 5 días previos, consultando a su médico.
- Si toma Sintron o heparina, deberá consultar a su hematólogo.
- Si es diabético tratado con insulina, consulte a su médico.
- En algunas patologías (enfermedad valvular cardíaca, prótesis vascular...) es necesario administrar una profilaxis con antibióticos. Previamente, debe consultar a su médico para que programe la administración del tratamiento.
- Si presenta fiebre, cuadro catarral o gripal es recomendable retrasar la realización de la prueba.

QUÉ LLEVAR EL DÍA DE LA COLONOSCOPIA

- **Volante médico** para la realización de la prueba.
- Analítica reciente de coagulación (tiempos de protrombina, cefalina, plaquetas y fibrinógeno).
- Electrocardiograma (si lo tiene) e informes médicos de enfermedades actuales y/o pasadas, así como de operaciones.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MOVIPREP®

Pida con antelación en su farmacia MOVIPREP® NARANJA O MOVIPREP® LIMON.

Mezcle el contenido de los sobres A y B en 1 litro de agua y agite hasta que el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia.



Si su cita es POR LA MAÑANA:

1. A las 20:00h del día anterior a la prueba, beba cada 15 minutos un vaso entero de MOVIPREP® de modo que en 1hora se haya bebido el litro completo.
2. Tome ½ litro de líquidos claros, como mínimo, para prevenir la sensación de sed y evitar la deshidratación (agua, caldos filtrados, zumo de fruta sin pulpa, té o café sin leche y bebidas isotónicas.)
3. 5 horas antes de su cita para la exploración repita los pasos (1) y (2).

Recuerde que 3 horas antes no debe comer ni beber nada.

Si su cita es POR LA TARDE:

1. A las 08:00h de la mañana del mismo día de la exploración beba cada 15 minutos un vaso entero de MOVIPREP® de modo que en 1hora se haya bebido el litro completo.
2. Tome ½ litro de líquidos claros, como mínimo, para prevenir la sensación de sed y evitar la deshidratación (agua, caldos filtrados, zumo de fruta sin pulpa, té o café sin leche y bebidas isotónicas.)
3. 5 horas antes de su cita para la exploración repita los pasos (1) y (2).

Recuerde que 3 horas antes no debe comer ni beber nada.